

ZYNRAT[®]

BF

Pasta Fresca Azul



ROEDORES

RODENTICIDA CON ATRAYENTE
CEBO FRESCO
CON BRODIFACOUM



Es un cebo azul en pasta listo para su uso en bolsitas de 15 gramos para el control del ratón común y rata parda o de alcantarilla en todas las etapas del desarrollo, que contiene el ingrediente activo anticoagulante de segunda generación, brodifacoum. Eficaz en una sola ingesta.

USO PROFESIONAL Y PÚBLICO EN GENERAL.

ZOTAL[®]
LABORATORIOS

ZYNKRAT®

Pasta Fresca Azul



COMPOSICIÓN

Brodifacoum	0,0029%
(CAS N° 56073-10-0)	
Excipiente c.s.p.	100%

FORMATOS DISPONIBLES



Estuche
6 bolsas x 150 gr



8 Estuches
48 bolsas x 150 gr



FT



FDS



Para solicitar ficha técnica, ficha de seguridad, ver vídeos demostrativos o más información, escanea este código:

INDICACIONES, DOSIS RECOMENDADAS Y MODO DE EMPLEO:

El producto actúa por ingestión. El principio activo tiene una acción anticoagulante sobre la sangre, que causa en el plazo de unos días una hemorragia interna sin dolor, que no despierta desconfianza en los demás roedores. Los roedores una vez intoxicados, aún con una única ingestión, sufren síntomas de ahogo y tienden a salir al aire libre para morir.

Es un cebo en pasta lista para su uso en bolsitas de 15 gramos para el control del ratón común y rata parda o de alcantarilla en todas las etapas del desarrollo, que contiene el ingrediente activo anticoagulante de segunda generación, brodifacoum en una sola ingesta.

Método de aplicación: en portacebos resistentes a la manipulación.

DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Para el control de ratón común (*Mus musculus*)-interior:

- Alta infestación: hasta 50 g de cebo por punto de cebo, cada 2 m.

- Baja infestación: hasta 50 g de cebo por punto de cebo, cada 5 m.

Los portacebos deben revisarse al menos cada 2-3 días al comienzo del tratamiento y posteriormente como mínimo, una vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo, que los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos.

Para el control de rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*)- interior y alrededor de edificaciones:

- Alta infestación: hasta 90 g de cebo por punto de cebo, cada 5 m.

- Baja infestación: hasta 90 g de cebo por punto de cebo, cada 10 m.

Los portacebos deben revisarse a los 5-7 días después del comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo, que los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos.

Recargar el portacebos cuando sea necesario.

Alrededor de edificaciones: Colocar el portacebos en zonas no sujetas a inundación. Reemplazar los cebos que hayan sido dañados por el agua o contaminados por la suciedad.

FORMA DE PRESENTACIÓN:

Cebo contra ratas y ratones en general.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Formulación: sólido.

Olor: característico.

PERIODO DE VALIDEZ:

24 meses desde la fecha de fabricación.

AUTORIZACIONES:

Autorización no ES/MR (NA)-2021-14-00750.

UTILICE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA. LEA SIEMPRE LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE USARLO

Laboratorios Zotal S.L.U.

Ctra. Nacional 630, km. 809.
41900 Camas (Sevilla) ESPAÑA
Tel.: +34 954 390 204
Email: zotal@zotal.com



INFORMACIÓN AL USUARIO: +34 954 395 297

www.zotal.com